

Checkliste für elektive Aufnahmen



Klinikum Brandenburg
Hochschulklinikum der MHB

Herzkatheteruntersuchung (Coro, PTCA)

Verschluss des Foramen ovale (PFO)

Vorhofohrverschluss (ACP)

Vorhofseptumverschluss (ASD)

Renovasographie oder renale Denervation (RDN)

1. Metformin (Siofor, Glucophage) 48 h vorher absetzen
2. Phenprocoumon (Falithrom, Marcumar) 5 – 7 Tage vorher absetzen, überlappend niedermolekulares Heparin (z.B. Clexane) einmal tgl. nach Körpergewicht (z.B. bei 80 kg = 0,8 ml s.c. 1 x tgl.)
3. Xarelto/Pradaxa: wenn GFR > 80 nicht absetzen; wenn GFR 50 – 80, 1 Tag vorher absetzen, wenn GFR < 50, 2 Tage vorher absetzen.
4. ASS oder Plavix NICHT absetzen.
5. Koronarangiographie-Befunde und Herz-OP-Berichte aus anderen Krankenhäusern mitgeben
6. Aktuelle Laborbefunde (< 6 Monate) von Gesamt-Cholesterin, LDL-Cholesterin, HDL-Cholesterin, Triglyceride mitgeben.
7. Vor PFO/ACP Clopidogrel 300 mg Loadingdose am Tag vor der Untersuchung, dann 7 Tage 1x tgl.

Elektrophysiologische Untersuchung

- Phenprocoumon (Falithrom, Marcumar) 5 – 7 Tage vorher absetzen, überlappend niedermolekulares Heparin (z.B. Clexane) einmal tgl. nach Körpergewicht (z.B. bei 80 kg = 0,8 ml s.c. 1 x tgl.)
- ASS oder Plavix NICHT absetzen.
- Xarelto NICHT absetzen.
- Pradaxa: wenn GFR > 50 nicht absetzen; wenn GFR < 50 2 Tage vorher absetzen
- Antiarrhythmika wie Betablocker (z.B. Metoprolol, Bisoprolol) oder andere Antiarrhythmika (z.B. Flecainid, Propafenon) 2 Tage vorher absetzen, falls nicht unmittelbar Tachykardie droht, wie z. B. TAA oder VT
- Metformin (Siofor, Glucophage) muss nicht abgesetzt werden.

Kardioversion (CV)

- Falithrom NICHT absetzen.
Mindestens 4 Wochen vor CV muss durchgehend ein INR > 2 im Falithromnachweis nachgewiesen werden.
- Auch alle anderen Medikamente (z.B. Betablocker) können weiter eingenommen werden.
- Xarelto/Pradaxa und andere NOAKs durchgehende Einnahme für > 3 Wochen vor Kardioversion

Schrittmacher- oder Defibrillator-Implantation/-Wechsel

- Phenprocoumon (Falithrom, Marcumar) 5 – 7 Tage vorher absetzen, überlappend niedermolekulares Heparin (z.B. Clexane) einmal tgl. nach Körpergewicht (z.B. bei 80 kg = 0,8 ml s.c. 1 x tgl.)
- ASS oder Plavix NICHT absetzen.
- NOAKs (Xarelto, etc.) 1 Tag vorher absetzen bei Indikation Vorhofflimmern



Zentrum für Innere Medizin 1
Hochschulklinik für Kardiologie & Pulmologie
Klinikdirektor: Prof. Dr. med. Oliver Ritter
Hochschulklinik für Angiologie
Klinikdirektor: PD Dr. med. Ivo Buschmann

Sekretariat/Anmeldung:

Telefon: +49 33 81 - 4115 00
Telefax: +49 33 81 - 4115 09
innere.med.1@klinikum-brandenburg.de
www.klinikum-brandenburg.de
www.dzak.de
www.dhzg.de

Hochschulklinik für Kardiologie & Pulmologie
Klinikdirektor: Prof. Dr. med. Oliver Ritter
stellv. Klinikdirektor: Dr. Stephan Hiller
Leitung Elektrophysiologie: Jan Köneke

Stationäre Aufnahme

Anmeldung Herzkatheter, EPU, Implantationen
Sekretariat: +49 33 81 - 4115 00/50
Allgemeine kardiologische Sprechstunde
Sekretariat: +49 33 81 - 4115 00
Kardiologische Privatsprechstunde
Sekretariat: +49 33 81 - 4115 00
Studiensprechstunde
Anmeldung Frau Walter: +49 33 81 - 4115 12
Rhythmusprechstunde und Humangenetische Beratung
Sekretariat: +49 33 81 - 4115 00

Partner im überregionalen DZAK
Standort Brandenburg



DZAK
Deutsches Zentrum für Angiologie
und Kardiologie Brandenburg

Geschäftsführerin: Gabriele Wolter
Aufsichtsratsvorsitzende:
Dr. Dietlind Tiemann

Sitz: Stadt Brandenburg an der Havel
Registergericht: Amtsgericht Potsdam
Registernummer: HRB 10291

Bankverbindungen

Deutsche Kreditbank
IBAN: DE38 1203 0000 1008 3675 08
BIC: BYLADEM1001

Mittelbrandenburgische Sparkasse
IBAN: DE26 1605 0000 3601 0088 81
BIC: WELADED1PMB

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008



Mitglied im CLINOTEL
Krankenhausverbund